





TRATAMENTO DA TVP



Dr. ABDO FARRET NETO
ANGIO - HCN





MEDIDAS GERAIS

- 
- TRENDELEMBURG
 - REPOUSO NO LEITO
 - HIDRATAÇÃO
 - EVITAR ROUPAS CONSTRITIVAS
 - MEDICAMENTOS EM USO
 - ORIENTAR O PACIENTE E FAMILIARES
- 



HEPARINA NÃO FRACIONADA IV

- 
- DOSE DE ATAQUE
 - 5.000 a 10.000 UI ou
 - 80 UI/Kg
 - MANUTENÇÃO
 - 500 UI/Kg/DIA EM BI
 - 10.000UI/100ml SG
 - TTPa 2 a 2,5X
 - DURAÇÃO 5 a 10 DIAS
- 




HEPARINA NÃO FRACIONADA SC





- LIQUEMINE AMPOLA C/ 0,25ml/5000 UI

- 400 a 500UI/Kg/DIA

- 
- DOSE TOTAL DIVIDIDA EM DUAS APLIC. (12/12h)
 - DOSAGEM DO TTPa 6h APÓS APLICAÇÃO
 - AJUSTE DA DOSE: TTPa 2 a 2,5X



HEPARINAS FRACIONADAS SC

- 
- ENOXIPARINA (CLEXANE – 20 – 40 – 60 – 80 – 100mg)
 - 1mg/Kg 2 X DIA
 - DALTEPARINA (FRAGMIN – 2.500 – 5.000UI)
 - 100 UI AXa/Kg 2 X DIA
 - NADROPARINA (FRAXIPARINA TX – 0,6 – 0,8 – 1,0ml)
 - 0,1ml/10Kg 1 X DIA
-
- DOSAGEM DO TTPa 6h APÓS APLICAÇÃO
 - AJUSTE DA DOSE: TTPa 2 a 2,5X
- 



CUMARÍNICOS



- VARFARINA (MAREVAN 5mg)

- INÍCIO



- 24h APÓS A HEPARINA

- AJUSTE DA DOSE

- DOSAGEM DO TEMPO DE PROTROMBINA
 - 1980 – INR 2 a 3X
- 




CUMARÍNICOS

- 
- VARFARINA (MAREVAN 5mg)
 - 3 MESES
 - FAT. TROMBOGÊNICOS TRANSITÓRIOS
 - TVP DISTAL
 - 6 MESES
 - IDIOPÁTICA, SEM TROMBOFILIA
 - PERMANENTE
 - FAT. TROMBOG. PERMANENTES (CA, TROMBOFILIA)
 - TEV RECURRENTE
- 




FIBRINÓLISE / CIRURGIA

- FLEGMÁSIA
 - ALBA
 - CERÚLEA
- 



COMPLICAÇÕES

- DO TRATAMENTO
 - SANGRAMENTOS
 - TROMBOCITOPENIA (+/- 5% 7 a 10 DIAS)
 - TROMBOSE PARADOXAL
 - NECROSE CUTÂNEA
- 



COMPLICAÇÕES




- DA PATOLOGIA

- AGUDAS

- EMBOLIA PULMONAR
- FLEGMÁSIA

- CRÔNICAS


- S. PÓS TROMBÓTICA MMII
 - **VARIZES SECUNDÁRIAS**
 - **DOR**
 - **EDEMAS**
 - **ECZEMAS**
 - **ÚLCERAS DE ESTASE**
 - EDEMA E DOR QUANDO EM MMSS
- 



FILTROS DE VEIA CAVA




■ INDICAÇÕES

- EMBOLIA RECURRENTE EM USO DE ANTICOAGULANTE
 - CONTRA-INDICAÇÃO AO USO DE ANTICOAGULANTE
 - ...PROFILÁTICA?
 - LESÃO ESPINHAL
 - FRATURA PÉLVICA + TCE
 - BAIXA RESERVA CÁRDIO PULMONAR
- 



FILTROS DE VEIA CAVA

■ TIPOS

- MOBIN-UDDIN
- GREENFIELD
- GÜNTHER
- BIRD'S NEST
- SIMON NITINOL
- ELLA




FILTRO DE GREENFIELD




The unique corrugated leg design of the Greenfield Filter maximizes its ability to trap life-threatening emboli.



FILTRO ELLA



Bainha	Diâmetro do filtro	Comprimento do filtro	Diâmetro máximo da VCI	Níveis de filtragem	Característica de implante
6-7F	35 mm	47 mm	30 mm	2	Permanente/Recuperável





OBRIGADO

